

# Furkasjoner – fortvilelse eller fornøyelse?

**F**urkasjoner er vanskelige å finne og vanskelige å behandle, sa tannlege Ingvild Marie Ulvik, videreutdanningskandidat i periodonti ved Universitetet i Bergen. Underdiagnostisering er ikke uvanlig.

Hos periodontittpasienter har opptil 90 prosent av overkjevemolærer distale furkasjoner, og 35 prosent av underkjevemolarene har også furkasjoner.

Studier har vist at risikoen for tanntap er doblet på en tann med furkasjon. Diagnostisering gjøres med periapikale røntgenbilder, bitewing-bilder og furkasjonsonde. Behandlingen har som mål å fjerne plakk og tannsten fra eksponerte flater, etablere en anatomi som skaper forhold for plakk kontroll og hindre videre festetap.

Den etterfølgende vedlikeholdsfasen er vel så viktig som behandlingen. Grad 1 furkasjon kan behandles med depurasjon og furkasjonsplastikk. Ved grad 2 og 3 er behandlingsalternativene flere: Som regenerering, tunnelering, rotseksjon, hemiseksjon, rotseparering og ekstraksjon.

Hos periodontittpasienter er suksessraten for operativ behandling av grad 2 og 3 furkasjoner den samme som ved ett-tanns implantat. Det viser at det er verd å satse på tennene, sa Ulvik til slutt.

*Tekst og foto: Jon E. Dahl*



*Fra tannlege Ingvild Marie Ulviks foredrag om furkasjoner.*



*Tannlege Ingvild Marie Ulvik i samtale med tilhører etter foredraget.*