


Bittfeil – når og hva skal allmenntannlegen se etter?

For å kunne diagnostisere må en kjenne til normalokklusjon og frembruddstider for tennene.

Professor Bjørn Øgaard, Oslo, gav gode råd om diagnostikk av bittfeil hos barne- og ungdomspasienter.

Det vi skal gjøre, er hovedsakelig å telle tenner og å se etter agenesier. I melketannsett (3–6 år) gjør man minst mulig; små kryssbitt med tvangsføring kan slipes for korreksjon. I tidlig blandingstannsett (6–9 år) skal man være oppmerksom på manglende frembrudd av sentraler og molarer, og ikke vente-og-se, men gjøre tiltak for å få disse i frembrudd.

I sent blandingstannsett (9–11 år) skal man fokusere på agenesier og sekundær retensjon (ankylose). Auto-transplantasjon bør vurderes ved agenesier av lateraler. Behandling av dentoalveolære underbitt og store overbitt bør også starte i denne alderen.



I det permanente tannsettet (11–13 år) må man se etter ektopisk frembrudd av overkjevens hjørnetenner, over- og underbitt, dype bitt og trangstillinger. Behandlingstiden bør ikke bli unødven-

dig lang og derfor kan det i noen tilfeller være fordelaktig å starte etter at veksten er avsluttet.

Tekst og foto: Jon E. Dahl